

中國學化大小伽太縣與自然 婚爐福柳麻藥瘋然與自然 的越園病風發論痘海勿醫 地話 治之 治治新懷話 療研 學究 之 如 學究 之 一 得 心 □爲父母者應具的 兒驚風症最宜 第 醫 一藥常職 意之一點



保證實切有用信求務版出

0 園 10 0 幾何時 她那不定的心-0 了她的心旌。 0

格人及驗經識學有者持主

凍起瀉皆對。A (子桌登乙婆你甲不。友某了) 瘡來火屬着遠先 (全) 写上有大子不笑一朵菜甲 (全) 。問敗於學一生火姊。道此怒宇在迎刻甲乙還抱 也道毒火生天在嗎姊你。理道天家道。便。天了 是。之一道。某 脚為我…。。內。豪坐却無你 屬像劑。。他中 上甚是…你實。你乙在巧事的 於我。所一致醫 小學抱某這是對兩來廣堂乙去子等 以姊一以諸授學 凍生的甲混對兩來廣堂乙去子等 ,與學症療科當 也呢那笑東起抱。來等在訪天 也呢那笑東起抱。來等在訪天 上生皆過學數 屬。湯指西。下遊。他家他 的站用。。員 於 婆着。某你才奖。裏朋

化之原因甚多。有為停止注射過早者。有因注射藥液刺戟太甚者。有因嗜酒或操勞太至 不愈者。則謂之慢性淋。一說則謂之一月牢以上。尚洩曠液者。亦得日爲慢性。其

他覺之症候。僅尿道口有少許似膿之液洩出

雖溺時亦不覺痛

道狭窄之症。致生命于危險。男子慢性淋病 慢性淋即急性淋之末期。往萬不

随急慢性而不同。急性者治法得宜。攝生有方。約四六星期可愈

強度溷濁

且使豫後不良。病人視若等閒。不及早治之。勢必成慢性

似膿之液也。在經過之中。諸症忽進忽退。因之治愈遲緩。以淋至三月以上

之

究

鰗

S. T.